

太醫院經驗奇效良方大全

新刊太醫院奇效良方卷之十三

痢門 附論

夫痢者有云滯下今為痢疾脉經云陽澀下膿血脉沉小留連
者生數難且大有熱者死又腸澼筋繫其脉小細安靜者生浮
大緊者死嚴氏云下痢之脉微小者生洪者難治腸澼下膿血
者脉宜滑大若弦急者死仲景分治之法下痢脉沉弦者下重
脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死下痢手足
厥冷無脉者灸之不溫若脉不至反微喘者死下痢有微熱而
渴脉弱者令自愈脈數有微熱汗出令自愈設脉緊為未解下
痢脉數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也病機要
云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉弦則去風膿血稠
粘以重劑竭之身冷自汗以藥溫之風邪已縮宜汗之驚澀為
痢當溫之又云在外發之在裏下之在上瀉之在下竭之身表

熱內疎之小便澁分利之又曰盛者和之公者送之至者止之
蘭室秘藏云假令傷寒飲食脹滿而傳陰泄者宜溫熱之劑以
消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之風邪
下陷者升舉之濕氣內勝者分利之裏急者下之後重者調之
腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及拈衣其脈弦細而弱者溫之
收之膿血稠粘至固而不能便其脈洪大而有力者寒之下之
機要又云太陰經受濕而為水泄羸滑身重微滿不知穀味又
則防變而為膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈者若先瀉而後
滑謂之微邪故易愈此皆脾土受濕之所為也陳無擇云滯下
之證內經所載血溢血泄血便注下古方則有清膿血今為痢
疾其實一也多由脾胃不和飲食過度停積於腸胃不能消化
又為風寒暑濕之氣所干故為此疾傷熱則赤傷冷則白傷風
則下清血傷濕則下如豆汁今熱交併赤白兼下治法當通利

之藥疎滌臟腑嚴氏以已豆等劑推其積熱後辨以冷熱風濕之證用藥調治熱赤者清之冷白者溫之傷風而下清血者則法逐之傷濕而下豆汁者分利之冷熱相併溫涼以調之仍須先調胃氣切不可驟用罌粟訶子之藥止之泄之使停滯不泄多致危殆陳無擇又云古方風痺膏膜下瘀血或下鮮血濕毒下如豆汁皆外因之所致古方有五洩因臟氣鬱結隨其所發使利膿血作青黃赤白黑一一不同即內因也又飲食油膩熱物酒醴醢醢縱情恣慾房室致傷精血腸胃粘滯久積冷熱遂成毒痢皆不內外因治之先推其歲運以平其外察其鬱結以調其內審其所傷以治不內外條然明白不致妄投也此分三因而治用藥當以三因內求之大全良方云有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖重察運氣之相勝亦不可抑泥當先察其虛實冷熱首用敗毒以倍加人參甘草陳

皮隨證用之陳無擇又云飲食冷熱酒醴之醴腸胃粘滯久積
冷熱遂成毒痢張氏云或有飲冷酒寒物之慾勞傷精血而成
久痢則宜化毒以保衛之病機云裏急後重脈大而洪實爲裏
熱甚而閉是有物結墜也若脈大甚不宜下雖裏急後重而脈
沉細弱者謂寒在內而氣散可溫養自愈裏急後重閉者大腸
經氣不宜通也宜加檳榔木香宣通其氣原病式云下迫後重
裏急窘迫急痛也火性急速而能燥物故也機要云腹痛所
之如發熱惡寒腹不滿以黃芩多用腹痛甚者加當歸倍芍藥
百一選方云禁口痢是毒氣上衝心肺所致用石蓮肉以通心
氣丹溪云吃病氣自下衝上屬火之象古方悉以胃弱言之殊
不知胃弱者陰弱也證之甚也滯下之久多見此證乃久下而
陰虛也原病式曰或言下痢白爲寒者誤也若果爲寒則不能
消穀何由反化爲膿也所謂下痢穀反爲膿血如世之穀肉菓

寒濕熱甚則自化腐爛潰發化為污水也其熱為赤熱屬心火故其濕為黃濕屬脾土也燥鬱為白屬肺金也經曰諸氣憤鬱皆屬於肺謂燥金之化也然諸腐痢皆兼於濕今反言氣濕者謂濕熱甚於腸胃之內而腸胃怫鬱結而又濕至于否以致氣液不得宣通因以成腸胃之燥使煩渴不止也假如下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤悞豈知水火陰陽寒熱者猶權衡也一高則必一下一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃而同為痢也如熱瘡瘍而出白膿者豈可以白為寒欤其在皮膚之分屬金故色白也次在血脉之分屬心火故為血也其色紅在肌肉屬脾土故作黃膿在筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬腎水故紫黑血出也各隨五臟之部而見五色是其標也本則一出於熱但分淺深而已大法下迫窘痛後重裏急小便赤澀皆屬燥火而下痢白者必多有之然為熱明矣又云白痢既為

熱病何故服辛熱之藥亦有愈者耶蓋辛熱之藥能開發腸胃
鬱結使氣液宣通流濕潤燥氣和而已蓋病微者可愈甚者鬱
結不開其病轉加而死矣凡治熱甚吐瀉亦然夫治諸痢者莫
若以辛苦寒藥治之或微加辛熱佐之則可蓋辛能發散開通
鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已如錢氏香連丸之類
是也故治諸痢者黃連黃蘗為多以其至苦大寒正主濕熱之
病乃若世傳辛熱金石毒藥治諸吐瀉下痢或有愈以其善開
鬱結故也然雖亦可驗者或不中効更加苦丹溪曰或問何
間之言滯下似无挾寒者乎予曰淺痢之病水穀或化或不化
虛實何如惟竟困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或
腸垢或无糟粕或糟粕相混有痛不痛大痛之異然皆裏急后
重逼迫腦人似乎皆熱實證也原病式云所論痢之赤白皆云
有熱上在氣分為白熱在血分為赤上白相雜者氣与血皆受

病也。且滯下之證，古人多與泄瀉同論。至三因方始能另立條目。蓋實有不同。夫病有從外感而得者，須分六氣之異。外既受傷，腸胃鬱結，遂成赤白等證。當隨其氣血虛實以調之。有因臟氣發動，干犯腸胃而得者，須察其何臟相乘以平治之。之有因飲食失節而得者，則又審其何物所傷以消剋之。世之感此疾者，其因誠不越乎是三者。但其受病之后，腸胃怫鬱，膿血稠粘，乘急后重諸方，雖有寒熱虛實之論。劉河間則以為熱內經亦以熱多而寒少。丹溪以為挾虛挾寒之證。且前人立論各有立法。見證立方，各有受病之源。隨證用藥。后之學者，宜深審之，可不慎諸人之命，豈可輕忽也。

痢疾通治方

胃風湯

治大人小兒風冷乘虛客於脾胃，水穀不化，泄瀉注下，腹脇虛滿，腸鳴腹痛，及腸胃濕毒下如豆汁，或下瘀血。

白朮

白芍藥

川芎

人參

茯苓

去皮

當歸

各二錢

肉桂

半錢

右作一服水二鍾粟米一撮煎至一鍾不拘時服

地榆散

治大人小兒脾胃氣壅冷熱不調下痢膿血赤多白

少或純下鮮血裏急后重小便不利

地榆

乾葛

各四錢

乾姜

一錢

當歸

去芦

茯苓

去皮

赤芍藥

各三錢

甘草

炙二錢

罌粟殼

蜜炙六錢

右為細末每服二錢用溫熱水調下不拘時服

神效參香散

治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而或瀉或

下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤

白相雜裏急后重日夜頻數無問新舊並皆治之

白扁豆

炒

木香

人參

去芦

茯苓

去皮

肉苳蔻

源各四兩

罌粟殼

去蒂

陳皮

去白

肉桂

半錢

右為細米每服三錢用溫米飲調下不拘時服

木香散 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化腹中痞

痛久痢脾滑不禁

木香

赤石脂

訶子肉

附子

附子去

甘草

各一

藿香葉

肉豆蔻

各一

當歸

二錢

丁香

半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一箇煎一鍾不拘時服

其入養臟湯 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚

腦裏急後重臍腹疼痛如脫肛墜下酒毒便血並治之

肉桂

去皮

人參

去蘆

當歸

去蘆

訶子

去核

木香

不見

肉豆蔻

去殼

甘草

各一

白芍藥

白木

各一

瞿粟殼

去殼

製二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服臟寒者加附子

刺聖散子 治男子婦人遠年近日赤白下痢

羅果殼去蒂 黃藥去食 枳殼去穢 蘇米即粟

甘草炙冬 當歸去蘆 乾薑炒

右作一服水一鍾薤白二條擘碎同煎至一鍾空心服

訶梨勒散 治脾胃虛弱內積冷氣心脇刺痛嘔吐惡心腸鳴

泄痢水穀不化漸成痢疾

訶子去核 肉豆蔻去穢 青皮去穢 附子炮一

肉桂去皮

右為細末每服三錢淡生姜湯調下不拘時服

黑丸子 治脾胃法弱飲食過傷留滯不化遂成痢下服此藥

推導更須斟酌受病淺深增減丸數當參盡積滯方佳然

後徐徐補之

烏梅肉 杏仁去皮尖 半夏湯洗 縮砂各十

百草霜六錢 已豆霜六錢

早油

右為細末和勻用稀糊為丸如黍米大每服十五丸加至二十丸用白湯送下看人虛實加減丸數服之

駐車丸 治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不可忍者

黃連六錢

阿膠六錢

當歸六錢

乾姜三錢

右為細末醋煮米糊為丸如梧桐子大每服五十丸加至七十丸空心用米飲湯送下

五苓散 治伏熱下痢分利陰陽

方見暑門

黃連香薷散 治感暑下痢鮮血

方見暑門

香連丸 治冷熱不調下痢赤白膿血如雞糞急後重

黃連

去積十兩用吳茱萸五兩

木香二兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七十九食前用米湯送下

水瀉木香丸 治一切下痢赤白膿血和雜裏急後重

木香不見火 訶子炮去 當歸洗去麩各六兩 青皮去白

甘草各二兩 瞿麥去穢各二兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用水一鍾煎至

六分空心服

黃連阿膠丸 治必熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口

燥煩渴小便不利

黃連去鹽二兩 茯苓去皮 阿膠各二兩

黃連茯苓為末熬阿膠搜和為丸如梧桐子大每服五

七十九空心用水飲湯下

戊巳丸 治脾經受濕泄瀉不止米穀不化臍腹刺痛

黃連

去腐

吳茱萸

白芍藥

各五兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心用米飲湯下日三服

三蔻固腸丸

治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

肉苳蔻

去腐

木香

赤石脂

乾姜

厚朴

薑製

縮砂

各一兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服六十九空心米飲下
治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心煩腹痛

茜根

川升麻

犀角

地榆

當歸

去毒酒洗

黃連

去腐

枳殼

白芍藥

各等分

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服七十九空心用

米飲湯下

芍藥皮

治一切濕熱痢頻併寢痛無問膿血並宜服之

方見火門

阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛等證

阿膠 蛤粉炒 烏梅肉 赤芍藥 黃蘗 去皮

黃連 去鬚 乾姜 炮 赤茯苓 當歸 各等分

右為末入阿膠研勻水和為丸如梧桐子大每服五六十

丸空心用米飲湯下

地榆散 治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢

地榆 赤芍藥 黃連 去鬚 青皮 去白各等分

右為末每服三錢漿水調服如無只以新汲水亦得若血

痢水煎服

木芍藥湯 治痢疾痛甚者

蒼朮 一兩 芍藥 半兩 黃芩 官桂 錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

黃連湯 治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連 三錢 當歸 五錢 甘草 三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

當歸活血湯 一名桃在散 治腸辟血下濕毒下血

當歸身 升麻 各一錢 槐花 青皮

荆芥穗 熟地黃 白朮 各六錢 川芎 四錢

右為末每服三錢米飲湯調下不拘時服

木香烏梅丸 治大小便前後下血不止

烏梅 三斤 溫水浸 枳殼 各一錢 黃連 黃芩 黃蘗 百草霜

木香 各一兩 枳殼 炒 當歸 各一兩 半夏 薑製

槐子 枳殼 炒 當歸 各一兩 半夏 薑製

大黃 各五錢 陳皮 八錢

右為末用炒神麴四兩入煎藥一同研千餘下丸如梧桐

子大每服七十九空心用米飲下如硬加烏梅水和之
升陽除濕防風湯 治大便秘閉或裏急後重數至圓而不能便

或少白膿或少有血慎勿利之舉其陽則陰火自降矣

防風

白芍藥

各半錢

茯苓

各一錢

蒼朮三錢

甘草半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

白朮安胃散

治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無

度

白朮

茯苓

各一錢

車前子

各二錢

五味子

烏梅

各半錢

罌粟殼

半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

宿露湯

治一切痢

酸石榴皮

草薢

各半錢

青皮

二錢

椿根皮

二錢

杏仁計四 甘草一

右作一服用水二鍾生薑三片烏梅二箇煎至一鍾露一宿早晨服

木香薑薤丸 治臟腑冷極久冷傷儀口瘡下泄米穀不化飲

食無味肌肉消瘦心多嗔怒婦人產後虛冷下泄及一切

水泄冷痢脾泄此方於東坡家藏方內言用此藥與人莫

不神應備錄病愈人名姓茲不備述予用此方十餘年無

不取効脾泄者即愈而瀉痢者只一服見効惟熱痢熱瀉

不治蓋藥性熱也隨證用之

木香 破故紙各一 良薑 砂仁

厚朴各十 赤芍藥 陳皮 官桂

白朮各半 吳茱萸熟水 胡椒各半 肉苳蔻四箇

檳榔一箇

右為細末用漿水煮猪肝和藥搜勻仍用些麩糊為丸如
梧桐子大每服五七十丸空心熬稀米粥飲下

經金丹 治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不瘥愈

而復發腹中疼痛者宜服之

礞石無一方 乳香錢半 巴豆去皮心 杏仁去皮尖

硃砂一兩 木鱉半斤 白膠香一錢 黃丹半斤

此藥諸藥 硃砂三錢 半或研入硃砂子以赤石

右為細末鎔黃蠟一兩搜和丸如麻子仁大每服一丸小

兒半丸水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下赤

白痢甘草乾姜湯下並放冷臨卧服孕婦勿服忌熱物一

二時長一方蠟蠟入油二十點和劑令軟用油紙裹旋丸

均意九 治胃虛脾弱停積風冷大便泄瀉水穀不化腹脇

脹痛下痢膿血通數頻併裏急後重嘔逆惡心肢體困倦

飲食減少

肉豆蔻

炮炙

黑附子

炮炙去皮

川薑

炮炙

硫黃

研

白朮

炒

當歸

去蘆

訶子肉

桂心

各一兩

川烏頭

炮炙去皮

紅豆

右為細末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心

用米飲下

白朮調中丸

治脾胃不和心下堅痞兩脇脹滿腹疼痛噫

宿腐氣霍亂吐瀉米穀不消久痢赤白膿血相雜多日羸

瘦不思飲食

白朮

半兩

神麴

炒四兩

人參

去蘆

白茯苓

去皮

猪苓

去黑皮

澤瀉

各三錢

木香

二錢

官桂

去蘆皮一錢半

甘草

炙

乾姜

炮炙

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心用淡

生姜湯下

加味六均子湯 治一切脾胃虛弱泄瀉之證及傷寒病後米

穀不化腸中虛滑發渴微痛久不瘳者及治小兒脾胃泄

瀉得痢

人參

白朮

白茯苓

黃耆

山藥

甘草

砂仁

加厚朴

肉豆蔻

通果煨另研各七錢半

右為細末每服二錢用飯湯調服不拘時候如渴煎麥門

冬湯調服

震靈丹

治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面鰲腰脚時冷

禹餘糧

火煨研碎不計過

丁頭代赭石

如土法

赤石脂

紫石英

醋淬已上各四兩入甘

石脂

石脂內以瓦

煨通紅天書二宿研末用

滴乳香

沒藥

五灵脂

並去炒石別研各二兩

硃砂

一兩別研

右並研為細末糯米粉糊為丸如小雞頭大風乾每服三
丸用炒故紙入棗煎湯調鍾乳粉少許空心下小兒腎泄
白膿楊汁面點齒脫畏人怯寒瘰癧丹末入些鍾乳粉以
棗并炒故紙共煎熟湯調下

沒石子丸

治臟氣虛弱大腸滑泄次數頻併日漸羸瘠不進

飲食或久患赤白痢脾泄等病並宜服之

沒石子

南番省麴藥炮

肉苁蓉

麴藥二兩

訶子肉

濕熱

白薑

功作片

丁香

不見

赤石脂

別研

白茯苓

白木

已上各二錢

右為末和勻湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三四十丸
食前用米飲吞下一日三四服棗肉丸亦得

地榆湯

治泄痢無問老少

地榆

酸石榴皮

赤芍藥

厚朴

去粗皮

甘草

炙各半

阿膠

炙餅

白石脂

龍骨

炙各半

右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心日午溫服

斷痢散

治一切瀉痢腹痛久不差

肉苳蔻

乾薑

丁香

各半

訶子

去核

甘草

陳皮

各一兩

御米殼

去蒂蜜炒三兩

右咬咀每服二錢半水一盞乳香一粒粟米百粒同煎至

七分去滓溫服食前霍亂吐瀉冰冷服

育腸丸

治腸胃虛弱內傷生冷腹脹泄瀉時時刺痛腹急後

重下痢赤白或變膿血晝夜頻併經久不瘥此藥安腸胃

進飲食

烏梅肉

黃連

去根各一兩

訶子皮

鹽粟殼

去蒂炒

肉苳蔻

濕熱果各半兩

當歸

去蘆頭酒浸一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至五十九
空心食前飯湯下如小兒作小丸煎甘草乾薑湯下一方
如川芎一分

六神散 治瀉痢赤白腹痛不可忍痢久不止者

御米穀蜜炙青皮去白 陳皮去白 烏梅肉

乾薑炮各 甘草炙三

右件咬咀每服四錢水一盞半乳香一粒同煎至六分去
滓溫服食前日進二服一方無乳香赤痢冷服白痢熱服
花痢溫服一方無乾薑

治泄痢方 夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得

疾泄痢連月夢壁間有韻語方一紙讀之數過其詞曰

暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則癰獨煉雄黃蒸餅
和藥甘草作湯服之安樂別作治瘡醫家大錯如方服之

遂愈

石榴皮散 治暴瀉不止及痢下赤白

右用酸石榴皮燒灰存性不以多少研為細末每服二錢空心用米飲調下

灸鷄散 治脾胃氣虛腸滑下痢

右用黃雌鷄一隻治如食法以炭灸之撻了以鹽醋刷之又灸令極乾燥空腹食之

不二散 治諸般瀉痢神効

嬰粟殼 青皮去穢乾 陳皮去穢焙乾

當歸去蘂 其草炙 甜藤代如無只以乾葛

右件咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓通口服如患赤白痢用酸石榴皮一片同煎極妙

神効鷄清丸 治一切瀉痢

木香 二兩

黃連 二兩

肉苁蓉 七箇大

右先為細末取鷄子清攪和藥作餅子於慢火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲湯下

御米丸 治一切瀉痢

肉苁蓉

訶子肉

白茯苓

白朮 各一

石連肉

當歸 各半

乳香 三兩

罌粟殼 一及半

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心用米飲下如血痢減苁蓉白朮當歸罌粟殼

地榆丸 治瀉痢或血痢

地榆 微炒

當歸 微炒

阿膠 糯米

黃連 去黃

訶子 取肉

木香 微乾

烏梅 去核取肉押已

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三十粒空心用

陳米飲吞下先公頃在扶養病痢踰月得此方而愈頃在
害上士人蘇子病此危甚其婦翁孫億來告急錄此方以
與之捷即痊安致謝云

治痢仙方

詩曰

八痢臨終事可危

仙方等分與均醫

三香止痛最為緊

四白和中不可虧

甘枳更加罌粟殼

訶榆全藉石榴皮

半夏李朴黃連橘

救苦天醫只片時

丁香

沉香

木香

白木

白芷

白茯苓

白芍藥

甘草

枳殼

罌粟殼

訶子

地榆

酸石榴皮

半夏

李朴

黃連

陳皮

右各一錢分作五服白加生薑煎赤加烏梅煎食前服
治痢如聖散 治一切痢疾無問久新或赤或白或赤白相雜
日夜無度悉能治之紹興壬子浙東提舉黃即中施此藥
頗有效驗

當歸

地榆

縮砂仁

赤石脂

陳皮

石榴皮

訶子肉

罌粟殼

乾薑

甘草

各等分

右為簾末每服三錢水一盞半入陳霜梅一箇煎至七分
去滓赤痢冷服白痢熱服赤白痢溫服年高婦小兒皆
可服忌生冷油膩物

治痢方

右用生鷄子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取鷄子白
攤徧連紙日乾搗作四重包撮烏梅火熨斗中用白炭火

燒煙盡取出以盞碗蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許
和勻如大人患分為二服小兒分為三服不拘時赤白痢
空心并花水調服如覺臟腑微有疎利更不須再服
秘方養臟湯 治五色痢經驗

陳皮去白

枳殼去穢

黃連去須

烏梅去核

南木香

杏仁去皮

厚朴去蘖皮甘草炙

罌粟殼

去蒂膜蜜炒一兩

右剉散五色痢黑豆棗子煎服紅痢生地黄春茶甘草節
煎服五色痢久不効加龍骨赤石脂人參芍藥各一兩為
末煉蜜丸為梅甘草湯下粟米飯亦可立効

黑龍丹

治痢疾不可者

右用十二月殺的猪膽可收一百之上將雄黑豆裝入膽
內麝香少許陰乾看人大小每服五七粒為細末如紅痢

甘草湯下如白痢生薑湯下

獨神丸 治一切赤白痢不問久新百藥不効者

右用罌粟殼十兩重分作三分一分醋炒一分生用去核
又蒂萼一分蜜炙研爲末煉蜜和丸如小指頭大紅痢生
地黃春茶煎湯嚼下白痢烏梅并草節俱爲末二錢陳米
鹽湯下亦効一方薑煎一方用米醋一中薑將粟殼且炙
且蘸候盡色黃爲焙乾研爲末煉蜜爲丸如彈子大每服
一丸水一盞入生薑三片煎至八分通口服

痢藥乳香散

白梅燒灰

棗子

燒灰

訶子

半兩

罌粟殼

燒灰

右爲粗末每服一二錢用水一小盞入乳香一小豆許同
煎至七分不拘時溫服

治痢方

右用臘茶爲細末不以多少用白梅肉和丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下泄瀉不止陳米飲下每服二十九團茶尤佳大凡痢疾不問赤白而後爲冷熱之證若手足和暖則爲陽當先服五苓散用粟米飲調下次服感應丸二十粒即愈若手足厥冷則爲陰當服暖藥如已寒九附子之類如此治痢無不効有人夏月患痢一日六七十行用玄

苓散立止

遇仙立効散 治諸般惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重

臍腹疼痛或下五色或如魚腦日夜無度或禁口不食不

問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

川當歸

洗

甘草

炙

御米殼

去蒂蓋炒
各二兩

赤芍藥

地榆

酸石榴皮

各半
兩

右爲齋末每服三錢水一盞半煎至七分空心溫服小兒

量歲數加減以瘥為度忌生冷油膩腥月等物一方入赤茯苓北棗等分

金粟湯 治丈夫婦人室女小兒一切下痢無問新久冷熱不調日夜無度臍腹疼痛諸痢肢體困倦小便閉澀不思飲食漸加羸瘦大治內傷生冷脾胃怯弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

陳皮

去白一分

車前子

炒四兩

乾薑

炮二兩

甘草

炒

罌粟殼

去核帶蜜炒各半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇煎七分空心食前稍熱服或飯飲調下亦得忌生冷油膩魚酢醬等物

犀角丸

但是瀉服之無不瘥

犀角屑

取黑色文犀角者生後彌佳

宣州黃連

苦參

多買

金州黃蘗

赤色緊

川當歸

五物俱

右各搗研為末各等分和水空腹爛煮糯米飲調方寸七服之日再服忌粘滑油膩生菜

聖藥

治一切下痢臍腹疔痛

木香

二錢半

乳香

別研

沒藥

別研各一各

肉苁蓉

二錢

右為末每服一錢大乾棗一枚去核先入一半藥在內次用水浸巴豆半粒再入藥末半錢合定用油餅麪裹一指厚火煨麪熟為度去麪并巴豆不用只細嚼藥末飲空心下一方用乳香一兩研肉苁蓉二兩煨作末用陳米糊為丸服効

治痢絕妙丸

金櫻花葉及子

罌粟殼

去蒂等

右為末煉蜜為丸如手指頭大五色痢用春茶陳皮煎湯下如為未用蜜一匙春茶烏梅煎湯調服

楊梅方

和五臟能滌腸胃除煩悶惡氣切不可多食甚能損

齒及筋亦能治痢

右用楊梅燒灰研為細末每服一錢食前用白沸湯調服

百中散 治一切痢不問赤白或一日之間一二百行只一服

便疎再二三服即愈

瞿粟殼

三斤去上下蒂頂隔剉成

厚朴

三斤去麤皮用生薑自然汁淹一宿炙令薑汁盡為度等細

右為細末每服二三錢空心用米飲調下忌生冷油膩患

鮮毒物三日

治痢千百種雜下

黃連

三兩

烏梅

十四

右用以水八升煮取四升停冷納雞子白一枚攪調又煎取二升分為三服一方下痢熱諸治不瘥為末煉蜜為丸

如梧桐子大每服二十九日三夜二米飲送下

真方聖散子 治男子婦人脾胃受暑中脘停寒契物頻傷心

胃滿悶脇助膨脹居為屋脊小腹堅痛臍下強急或大便
不調或發熱或寒或下痢膿血或下五色或便如魚
腦或如豆汁或有血或如爛肉相似日夜無度久而不
愈嗜臥怠惰羸瘦肢體沉困寒熱時作此藥能固養脾胃
溫中止腹痛服之甚有所益

訶子皮 乾薑炮 揀丁香 肉苳蔻麩裏煨

烏魚骨去皮 赤石脂 甘草炙黃各一兩 御米殼五兩炒

右為細末每服先用水一盞入乳香少許煎五七沸調藥
末二錢食前熱服

治痢

右用罌粟古方未聞今人所用雖其法小異而皆有奇功

或用數顆慢火炙黃為末米飲下或去粟用殼如上法或以殼五七枚甘草一寸半生半炙用水一大碗煎取半碗溫溫呷服即愈

瓜薑散 治五色痢疾久不愈者

瓜薑

一箇黃色者以炭火烘存性用薑定地下一宿出火毒

右研為細末作一服用溫酒調服胡大卿有一僕患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

止痢法

肉苳蔻

一介 訶子 二介 去核

右為末每服一錢空心用米飲調下

下禮散 治陰陽相搏真氣失守上盛下寒便痢不禁先宜同

住腸胃

白茯苓

白水各半

木香溫氏

草菓仁

陳皮

訶子

白扁豆

生姜自然汁煮去皮炒各一分

罌粟殼

蜜煎慢火炙七次一水半

右同為末每服五錢濃煎粟米飲一大盞同藥煎至七分

空心溫服

百歲丸

治一切惡痢雜下赤白及休息等痢

漏蘭子

一箇大者阿膠

木香

罌粟殼

黃連

各半

乳香

少許另研

右除乳香外將餘藥剉作小塊炒令焦黑色存半性不令

煙絕研為末入乳香和勻用麪糊和丸如梧桐子大每服

一歲服一九十歲服十九依歲數服之不拘時米飲下

育腸湯

治腸胃虛弱內挾風冷臍腹掣痛下痢虛滑或變膿

血並宜服之

人參

白朮

高良薑

肉桂

去心

赤石脂煨過 當歸洗焙 附子去皮 肉苳煨香

甘草炙 厚朴去麁皮

右各等分為籠末每服五水二盞入梗米二百粒同煮

至一盞去滓溫服

玉粉散 治血痢解臟腑積熱毒

海蛤

右為細末每服二水蜜水調服

木香散 治隔年痢不止并血痢

木香 黃連炒 甘草炙 栗殼去赤膜

右為末入麝香少許每服二水米飲湯調服

葛根湯 專治酒痢

葛根 枳殼 半夏 生地黃

杏仁去皮 茯苓各二分 黃芩二分 甘草炙

右分作二貼水二盞黑豆百粒生薑五片白梅一丁煎至

一盞去滓食前溫服

神助散 治休息痢氣痢膿血不止疼痛因弱

當歸 烏梅肉 黃連各等分

右為細末研大蒜作膏和丸如梧桐子大每服三四十丸

厚朴煎湯下一方研阿膠

木香散 治氣痢泄瀉心腹疼痛

木香 沉香 官桂去麋

胡椒 當歸切焙 乾薑炮 附子炮裂去

密陀僧 甘草炙 肉苳蔻一枚 赤石脂

龍骨各半

右為細末每服一匙食前用米飲調下

地榆湯 治脾毒氣痢下血如鵝鴨肝腹痛不止

地榆

訶子肉

各一當歸切焙

甘草

各半

栝實

茜根

芍藥

赤茯苓

各三分

右細剉每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服一方無赤茯苓有炒黃連一兩

龍骨散

治氣痢腹內虛鳴日久不差

龍骨

黃連

去鬚

黃蘗

去麁

乾薑

炮

阿膠

炙燥

人參

厚朴

去麁皮生薑汁炙各二兩

右為細末每服二錢空心粥飲下日再

神驗丸

治冷勞氣痢腹脇疼痛水穀不消

陳麴

吳茱萸

湯浸焙乾

黃連

去鬚

燕羹

各三分

右為細末生薑汁和為丸如梧桐子大每服十五丸合煎

用溫米飲下

木香縮砂散

治氣痢腹脹腹中虛鳴

木香二兩

縮砂仁半兩

去殼

訶梨勒皮各三

右為細末每服一錢空心用陳米飲調下良久以食壓之

牛乳方

治氣痢日久不差諸痢困弱諸藥不効者

右以牛乳汁煎薑搗服之立瘥唐貞觀中太宗苦於氣痢詔問殿廷左右有能治其疾者當重之賞有術士張寶藏進此方時賞官三品一方牛乳半升薑搗末二升七同煎減半空心服

巴石丸

治氣痢

右以白礬飛令雪白謂之巴石以熟豬肝作丸空心米飲下丸數隨人力氣加減若得水牛肝更妙素食人蒸餅丸之亦可或云白礬中青黑者名巴石一方白礬不以多少以炭火於淨地上燒令汁盡變其色如雪名之巴石一兩研

藍青丸 療中焦水穀下痢

藍青汁 三升 黃連 八兩

黃柏 四兩

阿膠 五兩 炒燥

白朮

地膚子

烏梅肉

地榆 各三兩

右為末用藍汁和微大上煎取可為丸如青杏大每服二
一丸空心用溫白湯化下忌猪肉冷水桃李雀肉
附子五味子散穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每遇冷便
發有此候者宜服

附子 炮

細辛

白朮 各五兩

乾薑 四兩

神麴 一升 蒸

右為末以飲下之物服一方寸匕日再服稍加至二三

匕良忌猪肉冷水生梨桃李雀肉等

神妙橡實散 治水穀痢無問老小日夜百餘行

橡實 二兩

乾楮葉 一兩

右為末每服一錢不拘時烏梅煎湯調下

蝟皮丸 治臟腑傷動腸胃虛弱血滲腸間風冷相乘大便下

血瘀黑有片或五痔腫痛久下膿血者

蝟皮

一斤切炙令焦

槐實

炒

續斷

黃耆

連翹

當歸

焙

乾薑

炮

附子

炮裂去皮臍

白礬

飛各二兩

生乾地黄

五兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心食前

用米飲下

茜根散 治蟲注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶

茜根

川升麻

犀角屑

地榆

剉

黃芩

黃連

炒各一兩

右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

治腸蟲先下赤後下黃白沫連年不瘥兼治痢下應先白後赤

若先赤後白為腸蠱

右用牛膝一两切推碎以醇酒一升漬一宿平旦空心服之再服愈

阿膠丸 治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可忍

阿膠唯碎炒 乾姜炒 木香 黃連炒

當歸炒 黃芩各一两 赤石脂 龍骨各二两

厚朴生美汁塗炙

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時以

粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸乏力

木香 乾姜炮 甘草炙 黃芩各半两

栝葉炙 當歸炒 白朮 乾熟地黃各三

黃連二分

右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不拘時溫服
歸連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸

黃蘗

黃芩

阿膠炒

熟艾各二

黃連四分

右為末以醇醋三升煮膠烱下藥煮令可為丸如巨大每服七八十九日二夜一月米湯下若產婦痢加蒲黃一兩
煉蜜和丸

阿子散

治冷熱痢腹痛不能飲食

附子

炮裂去

黃連去

去

地榆

龍骨各一

當歸

三分

木香

右為末每服二錢不拘時以粥飲調下

內補丸

治冷熱氣不和腹痛下痢不止及通血氣

黃連

一兩去

乾薑

半兩

當歸

三分

阿膠

三分

黃

右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服三十丸不
拘時以粥飲下日再服一方以方以醋煮膠令消緩手搥

九又療產婦下痢不止者服之甚驗忌生冷膩

加減當歸地榆散 治冷熱不調氣毒惡毒濕熱腸垢毒痢休

息當歸別腥穢乾嘔不食肌熱小便澀
當歸 焙二 地榆 黃連 揀淨 芍藥

甘草 焙各 御米殼 蜜炒

右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服日

進二服氣毒痢加黃連當歸一倍

和中散 治冷熱痢腹瀉痛裏急

附子 炮太 黃連 去 乳香 研

右如患冷熱痢取黃連附子各半錢乳香一字以陳米飲

調下未止再服以青皮湯調下如患赤痢附子永半錢黃

連末一錢乳香一字如患白痢黃連半錢附子末一錢乳香一字米飲調下未止以黑豆七粒煎湯止之

楊子建萬全護命方 今有人患痢其脉微小者再尋之大沉而濡此之一候若下白痢其勢雖重庶幾可治若是下血勿忌發熱通身發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中間忽止有一年其故何也答曰六十年中未嘗有一年無水土相攻未嘗無七火相鬱未嘗無水火相犯但五運之政譬如癰衛一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作忽若一氣太過一藏有餘痢疾之生應不旋踵予故備陳其粗以開後矣人未悟庶幾診察之間無差悞之過若矣但毒痢傷人不一惟

邪犯心為重世入初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思喫冷水忽思在走渾身肌肉疼痛着手不得此候十難治其三四也治疫毒痢方須是子細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭嘔或吐熱忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白痢忽先下白痢後變成赤痢忽先下赤痢後却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發寒熱頭痛即是寒邪犯心寒氣犯心水火相戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中所以多下赤痢如紫草水如莧菜水無色澤者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸減也

赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕之氣相持也忽有
赤多而白少忽有赤少而白多此寒邪之勢有多少毒痢
之病有重輕以白多為輕赤多為重治之之法先奪其寒
則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午
庚子庚午年丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申并辰戌
之年運遇丙甲及庚運所臨其害尤甚又丑未之年宜有
此候又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡
此但世人亦不必撞定太歲但看一年中春夏之內多有
寒肅之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多
寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先轉
數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並宜與此通神散
藥後取壯熱便退若兩三盞後壯熱不退更不與此方自
別有方論在下

麻黃

去根

官桂

去粗皮各三分

大芎

白朮

各二兩

藁本

獨活

桔梗

防風

芍藥

白芷

各半兩

牡丹皮

去心

甘草

各一分

細辛

牽牛

各半兩

右為細末每服二錢非時熟湯調下和滓熱喫若喫兩三

盞後寒熱不退更不請喫自別有方論在下

若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便脩合第二方第三

方藥喫取安効

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不可多喫一日

只兩盞後赤痢消減忽變成白痢旋次脩合第二方喫候

出後度數減少便脩合第三方喫取平安但六甲之年六

庚之歲春夏之內時氣多寒人得前疾此藥通神若是六

甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱即於方

內添草薺一兩同脩合也又不問太歲但一年間春夏

之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜喫此方
治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消滅宜進
此還真散若喫前方藥寒熱未退赤痢未消滅更不宜進
此藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡
其子細

訶子

五箇用麝火炮熟不要生亦不要焦去殼不用只用皮焙乾

石搗羅為細末每服二錢匕以米湯一盞半同藥煉取一
盞空心和滓喫若吐出一兩口延更佳如此喫經數盞大
時漸安出後減少脩合第三方藥喫以牢固大賜若喫前
方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病熱已減所下之痢上餘此小忽下
清糞或如鴨糞忽如湯或如濁忽只餘些小紅氣

契此方以牢固大腸還復真氣船上硫黃丸

船上硫黃二兩去石薏苡仁二兩炒熟

右二末相和令勻滴熟水和為丸

九空心以米湯下

治下赤痢身體並無增寒壯熱此名肝心雙澀宜服此方

黃連一兩炙令香熟木香三錢

右為細末每服二錢七食後濃煎陳米湯調下

建脾丸治心胃弱洩下不禁飲食不消腸鳴疴痛

附子炮蜀椒各一兩出日桂心赤石脂

黃連石斛人參茯苓

乾薑大麥冬當歸陳麩各二

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九酒下稍稍加

之日三服忌猪肉冷水生葱醋仍有鍾乳粉三兩

十寶湯

治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黃耆

四兩

熟地黃酒浸 白茯苓

人參

當歸酒浸

白朮

半夏

白芍藥

五味子

官桂各一兩

甘草半兩

右為麤末每服二錢水一盞生薑三片烏梅一箇煎至七

分食前溫服

外灸膏 治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不禁心腹冷

極皆可用

木香

附子炮

蛇床子

吳茱萸

胡椒

川烏

各等分

右為細末每藥末三錢用麝二錢用生薑自然汁調作糊

貼臍中上下以衣服物蓋定熨斗盛火熨之痢止為度

五神散 治大腸積冷下痢不止裏急後重腹痛

附子炮裂去

烏梅去核各半兩

乾薑炮

訶梨勒煨去核

延胡索各一兩

右為麤散和白麪裹煨慢火內燒令麪熟為度去麪焙乾搗羅為細末每服一錢空心食前用米飲調下

倉米湯

治小腸冷氣積聚結成冷痢日夜三四十行

倉粳米半升用水淘洗乾淨

香豉三升以水一斗取五升澄清

薤白青一握去細切羊脂熬一片

右先以羊脂煎薤白令黃并米內豉汁中煎取四升平日空腹溫服一升如人行十里久更進一升得快痢止若痢不止更服如前利後進粳米豉粥若復作更服一劑永瘥

猪肝丸

治冷勞氣痢久不瘥

漬猪肝

一片以醋一升煎醋令盡

大蒜煮令熟

烏梅肉

桂心

黃連去屑

厚朴去麤皮養汁

乾薑炮

陳皮

湯浸去白

訶梨勒

去核

當歸

切焙各一兩

右除猪肝蒜外搗羅為末將猪肝與蒜細研如麪糊入藥末和勻搗數百下丸如梧桐子大每服三十九空心用熱麪湯下日午再服

猪胆丸

療冷痢久不瘥方云此是脾氣不足暴冷入脾故舌

上生瘡飲食無味縱喫下還吐小腸雷鳴時時心悶皮乾粟起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重日漸瘦劣或成氣塊及婦人血氣不通逆飯憂煩行常無力四肢不舉丈夫瘕癖兩肋虛脹變為水氣服之皆効驗此法出於傳屍方右用猪胆一具細切青蒿葉一合相和微炒以無灰酒一大升火溫之乘熱內猪胆和蒿葉共一處再入桂心末一兩於酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等物

黃耆散 治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆 剉

龍骨

當歸 各三

生乾地黃 二分

黃連 去黃

黃蘗

黃芩

犀角屑

地榆 各半

石為細末每服二錢不拘時用粥飲調下

犀角散 治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶

犀角屑

黃連 去黃

地榆

黃耆 各一

木香 三分

當歸 半兩

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

黃連丸 一名羚羊角丸

治一切熱痢及休息痢日夜頻併兼

治下血黑如鷄肝色

黃連 去黃

羚羊角 兩半

黃蘗 去粗皮

赤茯苓 去黑皮

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九薑蜜湯下

暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下

生地黃湯 治熱痢不止

生地黃 半兩 地榆 三分 甘草 炙

右咬咀如麻豆大用水二盞煎至一盞去滓分溫二服空

心日晚再服

鬱金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金 槐花 炒各半兩 甘草 炙

右為細末每服一二錢食前用豆豉湯調下

如聖湯 治下痢赤白甚重者

人參 當歸 洗各三寸 滴乳香 一塊如 甘草 炙

大北棗 烏梅 各七箇 罌粟殼 一箇去 白芷 炒

縮砂仁 大丁香 各二十箇 生薑 二塊大者

右為末分三服水一盞半煎七分去滓服不用粟殼亦可

艾葉丸 治赤白痢血多痛不可忍

艾葉炒

黃連炒

木香一半生

肉桂生

地榆一兩

阿膠八兩

當歸切

各

右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服三十丸米飲下

治赤白痢 訝曰

三片生薑三箇棗

一箇烏梅三寸草

更加罌粟與陳皮

赤白瀉痢一齊掃

秘傳斗門散 治八種毒痢

臟腑撮痛

膿血赤白或下瘀血

成片子或有五色相雜

日夜頻併難治禁口惡痢裏急後

重久渴不止全不進食

藥不能治者立見神効

黑豆炒

乾薑炮

罌粟殼蜜炒

地榆炒

甘草炙

白芍藥

三兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分溫服

金鳳散 治男子婦人赤白痢疾

鳳眼草

粟殼

赤頭赤尾三箇燒存性

母黑豆

四十九粒

右為麤末加蜜一匙水二盞煎至一盞去滓空心溫服服

此藥後仰臥睡忌冷水

安和飲子

治赤白痢不問老幼並治之

罌粟殼

木香

各二錢

甘草

炙

地榆

各二錢

右為細末每服二錢米飲湯調下

變通丸

治赤白痢瘕腹痛日夜無度膿血相雜裏急後重及

治腸風下血

吳茱萸

黃連

右各揀擇淨其酒浸透却擇出各自焙乾各自碾為細末各自粟米飯丸如梧桐子大每服三十丸如赤白痢相雜各十五丸用甘草煎湯下紅痢甘草湯下黃連丸三十

九白痢乾薑湯下茱萸丸三十九一方為末米飲調下加
當歸此方浙西河山純老以傳蘇軾光云數十年救人無
數人多求方不敢輕授恐以其藥品之微而忽之軾光每
以救人甚効洪氏方亦有脩製湯使少異

薤白散 治赤白痢

右用薤白一握切搗如泥橘皮一两好乳一升先以少乳
煎薤熟後下餘乳及橘皮末勻攪煎十餘沸空腹分兩服
之如嘔忒不止更作之

治下痢赤白

右用老酸石榴皮微炙為末以粟米飯為丸如梧桐子大
空心服滑則加附子赤石脂一倍

神効散 治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅三箇用黃泥裹杖慢火內煨乾研為細末用

米湯調下

御愛丸 治榮衛氣虛凡雅襲於臟腑之間值腸胃虛弱精粕

不聚便利赤白或作膿血臍腹疼痛心胃痞滿裏急後重

煩滿渴逆脇肋脹滿腹內虛鳴四肢倦乏不進飲食宜服

御米穀

四乃以蜜炒黃色

乾蒸餅

切如殿子火以蜜炒焦色

右為細末煉蜜為丸如鷄子大每服一粒用水一盞煎至

化為度不拘時熱服

鯽魚方

治赤白痢及治野鷄病

右用鯽魚作膾食之止暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬

食之有少冷溫二服

玉胞肚

治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不禁心腹冷

極者可用

針砭

四乃

白礬

半月

官法

一乃

右為末和勻作一包令水調攤皮紙上貼臍上下以帛繫之如瘡大熱即以衣襯之藥乾再以水溫令潤其熱如初可用三四次

軟紅丸 消腫積治冷熱不調下痢赤白膿血相雜

乳香

別研一皂

大礪砂

別研一皂

蠟

二枚

續隨子

四十枚去皮

粉霜

別研

膩粉

別研

黃丹

別研

硃砂

一兩別研

巴豆

二十枚去皮不

黃蠟

半兩

右末共和勻用磁器內溶蠟成汁入麻油半茶腳許後入藥和丸如菽豆大每服二九乳香湯下小兒丸如黃米大每服一九乳香湯下食前服

千金散

治赤白痢日夜無度服之立瘥

人參

五十

紫蘇

連梗

糯米

各二

罌粟殼

二十文

陳皮

良薑

燈心

甘草

黑豆

藥豆各五

右二豆搥破水一大椀同諸藥煎一盞半入熟蜜少許去滓通口服不拘時候禁口如腸潰者只兩服傳於臨汀學正賴簡敬賴得於趙守兼善兼得之余丞相匡言

治赤白痢

石用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若水痢加甘草末一錢七若微有膿血加二錢七若血多加三錢七昔劉禹錫傳信方云予曾苦赤白痢下諸藥服遍久不瘥轉為白膿令狐將軍傳此方服之効

豇豆

治白帶痢腹臍微痛

肉豇豆

藥

草豇豆

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

母丁香

藥

木香

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

墨燒紅為末

右為細末燒粟米飯為丸如櫻桃大每服二丸食前用米飲化下

萬補丸 治脾胃久虛大腸積冷下痢白膿或腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前產後皆可服立刻

人生 當歸切焙 草豈龜炮去 嫩茄茸酥炙

乳香各一兩五 白朮 吹起石火段細研 肉桂去皮

縮砂仁 赤石脂 鍾乳粉 肉豈慈煨

沉香 白薑炮 草揆牛乳半盞慢火煎乾焙

茴香 丁香 厚朴去皮 白茯苓各一

地榆 大麥蘖炒 神麴炒各半兩 大附子去皮

肉蓯蓉二斤淨洗用酒浸一宿切 嬰粟殼和米煮二

右為細末研勻用木瓜十五个去穰蒸爛同藥末搗和得

新九如梧桐子六曬乾每服三十丸食前用米飲下頗併者加至五七十丸

伏龙肝九 一名艾葉九 治赤痢腹痛四肢羸困

伏龙肝 艾葉炒 木香 地榆

阿膠炒燥 當歸切焙 黃連去黃 赤芍藥

黃芩去黑心

右為細末煉蜜為丸如梧桐子六每服三十丸不拘時用

溫粥飲下

六神湯 治赤痢腹痛或下純血

黃連去黃 車前子兩各二 地榆 山梔子仁

耳草炙各 陳皮湯浸去白

右吹咀每服五升以漿水一盞半煎八分去滓空心服

黃蘗九 治赤痢下黃水或黃赤膿四肢煩皮膚冷者

黃蘗去腐

黃連去黑心熟艾半斤

黃芩去黑心

右為細末用白蜜三兩煉熟入蠟一兩鎔化入前藥末和搗先如梧桐子大每服三十九空心用米飲下日晚再服一方作湯煎服

治赤白下痢久不止

右用黃連為末用鷄子清為丸如梧桐子大每服三十九食前用米飲送下即差

蒲葶散治血痢

蒲黃三台

乾地黄

桑耳

甘草

芒硝

茯苓

人參

栢葉

阿膠

艾葉

生薑各二

禹餘糧

黃連各一

赤石脂五分

右以水一斗煮取四升分作五服

龍骨丸 治下血痢腹痛

龍骨 龍膽草 羚羊角 當歸

附子 乾薑 黃連 赤石脂

礬石 犀角 甘草 熟艾

右為末煉蜜和丸如小豆大先食前米飲下十五丸

茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納食

茜根 地榆 生乾地黄 當歸

犀角屑 黃芩 梔子仁 黃連

右咬咀每服四錢以水一中盞入豉五十粒薤白七寸煎

至六分去滓不拘時溫服

六妙湯 治下血或痢不止

烏梅 甘草 丁香 桂心

罌粟殼 縮砂仁

右同拌勻作一服以水一盞半於銀石器內煎至七分已
銅鐵器去滓溫服滓用水二盞再煎至小半盞服

治男子病膿血惡痢痛不可忍積毒熱

昔有人忽見水浸甜瓜心酷喜之連皮食數枚膿血皆已
人言下痢無正形是何言也人止知痢是虛冷溫之燥之
洗之截之此外無術矣豈知風暑火溫燥寒六者皆為痢
此水甜瓜所以効也

椿皮丸

治下痢清血腹中刺痛

右用椿根白皮不以多少曬乾為細末酸漿麵糊為丸如
梧桐子大每服三四十丸空心用米湯送下

栢連散

治男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如靛

色所謂蠱痢者治之殊效一方又熊殺五臟蟲

右用側柏葉焙乾為末黃連亦為末二末同煎為汁服之

或用熱水調二錢服亦可

聚珍丸 治血痢酒痢尤妙

川百藥煎 半刀

薄荷煎 刀貼 陳槐花 半刀

感應丸 一貼 麝香 以計

右件為末拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸食前服男子用龍牙草煎湯下女人用生地黄煎湯下

治腸風血痢

右用鯽魚鱗白礬燒灰為細末每服二錢食前米湯調下

赤石脂湯 治膿血痢裏急後重日夜頻併

赤石脂 白正

天雄 炮裂去 當歸 切焙

龍骨 炙

肉苁蓉 去殼

黃連 去蘗

厚朴 去蘗皮

地榆

白木

官桂 去粗

訶梨勒 皮取

木香 一

吳茱萸 湯洗

黃芩 去黑心

右劉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分

去滓食前溫服

薑蔻八味散

治腸癰痢候或稀或稠便但似膿每便極滑痢

無常期

肉苳蔻

丁香

細辛

附子炮

乾薑

黃耆

人參

赤石脂

右搗篩為散以飲下之初服

一方寸七日再稍稍加至二

三七忌生葱猪肉冷水

解毒金華散 治下痢膿血熱毒

黃連

黃蘗

黃芩

赤茯苓

赤芍藥

白朮

右咬咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服無時如腹痛

加梔子二枚同煎

當歸四聖散 治一切下痢膿血頻併臍腹絞痛不可忍

當歸 切焙 芍藥 各二兩 御米殼 四兩 甘草 炒一兩

茯苓 半兩 黃耆 一兩二錢 無地榆同用

右咬咀每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫服

借氣散 一名神聖香黃散 治膿血痢久患脾泄瀉

黃連 去鬚 生薑 細剉 一兩

右二味同入銀石器內炒焦赤色去生薑取黃連為細末

每服二錢七食前陳米飲調下一方用臘茶清下甚者不

過二服差

魚鮮湯 治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸中攪痛

不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜 研 輕粉 硃砂 研 硃砂 研

白丁香 一兩 乳香 五兩 巴豆 二枚 去油

右為米蒸棗肉為丸嬰兒三九如粟米大二三歲如麻粒
大四五歲每服三四九並旋丸煎蘇湯吞下仍間服調胃
藥此證緣久積而成故小兒多有之

欬腸丸 治下痢膿血

木香 一錢 地榆 二錢 酸石榴皮 二錢

嬰藥散 落胎多寶丹

右件為細末煉蜜為丸如彈子大每服一粒陳米泔一盞

煎六分食前服

翅藥丸 治下痢數年不止消穀下氣補虛羸

官桂 去粗皮 附子 皮炮 黃連 去鬚 當歸

陳麴 炒黃 乾薑 炮 麥蘖 炒各一兩 吳茱萸 易炒

烏梅肉 蜀椒 去目并合口者炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至四十

九食前用米飲調送下一方用粟米糊為丸

御米湯 治久患痢疾或赤或白臍腹疔痛裏急後重發歇無

時日夜無度及下血不已全不飲食

罌粟殼蜜炙 白茯苓 去皮甘草 炙各五兩 厚朴 去皮薑

人參 去芦 乾薑 剉半

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片大淮棗三枚烏梅

一箇煎至一盞去滓食前通口服如年老七十八十歲每

服貳大錢小兒每服錢半依前法煎更量兒歲加減腹痛

加木香亦多加赤豆十五粒

雲母散 治久痢經年不瘥

雲母粉 白茯苓 去黑皮 附子 炮裂去皮

赤石脂 龍骨 各半

右為細末每服二錢食前用溫酒或米飲調下亦治血痢

金星膳散 治久痢

金星膳 醋炙 白礬 鉛丹各半

右為細末每服二錢食前用米飲調下

蝮蛇膳方 治溫痢久不斷體瘦多昏坐則閉目食不下

右用蝮蛇膳大如豆二枚煮通草汁研膳以意多少飲之

塗五心并下部

蕪荑丸 治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪荑 炒 黃連 去蘂各 蝮蛇膳 牛及

右為細末蜜煉和丸如梧桐子大每服三十丸食前用杏

仁湯下日再服

香栗散 治久新痢疾

罌粟殼 蜜炒 木香 地榆 陳皮

乾薑 炮 甘草 炙已上各半及

右件為粗末每服三錢水一盞半棗一枚煎至一盞去滓
食前溫服

五奇湯 治久患痢疾不問赤白並皆治之

訶子

二枚一投生用一投用麩

木香

一呢如

草豆蔻

二枚一投生用一投

甘草

一吋如荷面

肉豆蔻

二枚一投生用一投

右件為細末每服二升不拘時用米飲調下

烏梅湯

治久痢不瘥成腸疝

右用烏梅二十个搥碎用水一升煎四合去滓空心服末

愈日晚再煎服

麥蘗丸

治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘗

附子炮裂去

官桂

去皮

烏梅肉

白茯苓去皮人參各一

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸黃棗肉飲下不拘時服一方七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連

半斤去定粉

棗

二十枚

右春蠶如泥鋪於紙上安二味煎熟之燒令通赤取出候冷細研為末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥三升搽藥在肉上使濕紙裹燒熟放冷食之不過三兩服効

縛虎丸

治休息痢經一二年不瘥羸瘦衰弱治腰痛脾寒

等候

砒成塊

黃蠟

各半

右將黃蠟鎔開以柳條七箇逐箇掩頭焦即換俟用足取起旋丸如梧桐子大每服一九治痢冷水下脾疼亦然治腰疼冷酒下食前服小兒丸如粟米大服一九湯使同

治休息痢羸瘦宜服

杏仁

一及湯浸去皮尖又及仁麩炒黃色

漬猪肝

一具去筋切作片

右件將肝用水洗去血筋作片於淨鍋內一重肝一重杏仁入盡用童子小便二升入鍋中以物蓋慢火煎令小便盡即熟放冷任意食之

又方

一名羊肝散

證治同前

縮砂

一及去皮

肉苳蔻

半及去皮

右為細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙三五重裹上更以麩裹用慢火燒令熟去麩并紙入軟飯搗和丸如梧桐子大每服三十丸食前以粥飲下

枯薑根湯

治下痢冷熱相衝氣不和順本因下虛津液耗火

口乾咽喉常思飲水毒氣更增煩燥轉甚宜服此藥救之

枯薑根

白茯苓

甘草

麥門冬

各一及

右咬咀每服五錢水一盞半棗二枚擘破煎至七分去滓不拘時服

陳倉米 治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米二合水淘淨用水二盞煎至一盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米二合以水一盞半同煮研絞取汁空心頻服之
澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆

禁_{微炒}

桑根白皮

黃郁

李仁

湯浸去皮尖

炒熱各三兩

陳皮

去白

白朮

炒各

杏仁

湯浸去皮尖

炒一兩

人參_{半一兩}

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎取八分去滓溫服候半時辰再服取下黃水數升或小便利為度

茯苓湯 治痢後遍身浮腫

赤茯苓去黑皮 白朮微炒各一兩 防己 桑根白皮炙黃

黃芩 射干 澤瀉各三兩 澤漆葉

右咬咀每服五錢匕先以水三盞煮大豆一合取二盞去

滓內藥煎取一盞分為二服未瘥頻服兩料

消痞丸 治痢後肚腹滿悶

陳皮去白 青皮去白各一兩 木香二錢 蒼朮米泔浸焙

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒送

下小兒服三五丸米湯下

豬肝丸 治痢後脾胃虛弱不思飲食四肢乏力

豬肝一大葉以鹽煮 烏梅微炒 乾薑炮

草苴冠去皮 當歸微炒 桂心半兩 甘草一分炙

訶梨勒皮用 葶藶各一兩 肉苴薤去殼 厚朴去粗皮炙

右為末用豬肝和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時以粥飲下

治禁口痢甚妙一名石蓮散

右用石蓮肉不以多少剝去殼反將肉并心碾為細末每服二錢陳米飲調下便覺思食此疾蓋是毒氣上衝華蓋心氣不通所以不食服此藥後心氣通利當頓下而愈未愈自服痢藥一方仍以日照東方壁土炒真橘皮為末薑棗略煎佐之澹家云痢疾不納飲食者俗謂之禁口今人多以四柱散理中湯參苓散加肉苳蔻木香或噯震靈丹等藥調之恐非其治當以脈證辨之如脾胃脈不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以吐而不食宜用敗毒散每服四錢重入陳倉米一百粒薑三片棗一枚水一盞半同煎八分溫服若

其脉微弱或心腹盈膨手足厥冷初病則不嘔因服罌粟
殼烏梅散劑或服涼劑太過以致聞食先嘔此乃脾胃虛
弱一方用乾山藥剉如小豆大一半銀鈔內炒一半生月
同為細末飯飲調下

陳慶長知縣云頃守官南康其子年十許歲患禁口痢水
漿不入數日惟能進藥同官有方書載一治法試用之一
服而痢稍疎三服遂索粥飲頗食半盞許自是痢止而安
此乃用山藥一味

倉廩湯

治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參

茯苓

甘草

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

陳倉米

各等分

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓不

拘時熱服

參苓白朮散 治胃虛禁口

人參一 茯苓 白朮

山藥 蓮肉 砂仁 薏苡仁

桔梗 甘草 炙各

右為細末石菖蒲煎湯下宜食生韭菜

通神丸 治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥

沒藥 研一 五靈脂 去砂乳香 研各 巴豆霜 研半

右同研勻滴水為丸如黃米大

湯下小兒服三九隨歲加減

芍藥黃芩湯 治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪疾者及

下痢膿血稠粘

芍藥 黃芩 各一 甘草 半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服無時如
痛加桂少許煎服

三奇散 治痢後裏急後重

枳殼

黃耆

防風

右等分為末每服二錢蜜湯調下米飲亦得

治裏急後重

好蛤粉

川山甲

右等分為末每服一錢空心用好酒調服

大黃湯 治泄痢久不瘥膿血相雜稠黏裏急後重日夜無度

久不愈者

石用大黃一兩剉細以好酒二大盞浸半日許煎至一盞
半去大黃不用將酒分二服頓服之未利再服以利為度
後服芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯以徹其毒也

白朮黃耆湯 服前藥痢疾雖除更宜服此和之

白朮 一兩 黃耆 七錢 甘草 三錢

右咬咀分作三服用水煎服一方無黃耆用黃芩半兩

烏梅湯 療熱下痢方

烏梅 四十枚 梔子 四十枚 黃連 阿膠 炙

黃蘗 炙 二

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞溫服

治丈夫婦人小兒久痢成瘕百方不瘥

黃連 去鬚 麝香 研 丁香 各一分

右為細末每以一錢七用竹筒吹入下部小坑量度減之

不過三四上瘕一方食前以粥飲調下二錢

療五瘕蒸下痢

青黛 丁香 黃連 各等

右為細末用泔散和為丸如梧桐子大口中有瘡含之若

下部有瘡以綿裹內下部日服六十九食前米飲下

治疰蠱蟲蝕下唇裏生瘡多腫面黥時腫下部瘡痛不止

鷄子取黃一合 好漆一合

右相和令勻空腹仰頭頓服令盡當吐出蟲即愈

導氣湯 治下痢膿血日夜無度裏急後重

木香 檳榔 黃連各六分 大黃

黃芩錢半 枳殼錢半 芍藥六錢 當歸三錢

右咬咀作二服用水二盞煎一盞去滓食前溫服

白朮聖散子 治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢

當歸 肉苳蔻 砂仁 石榴皮

訶子肉 乾薑炮 陳皮 甘草

白朮 芍藥

右各等分咬咀每服五錢水二盞入乳香一豆許煎至一盞去滓食前溫服

立効丸 治痢

木香 當歸 酒浸 橡斗子 各一兩 青蒿子 燒存性

烏梅 焙乾 黃連 酒炒 五倍子 各二兩 枳殼 去穢一兩半

右為細末用神麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心用米湯送下日二三服先須服丁香脾積丸次服立効丸

木香黃連丸 治下痢膿血裏急後重神効

木香 黃連 川木通 川黃蘗

枳殼 炒 陳皮 各二錢半 大黃 三錢

右咬咀分作二貼用水二盞煎至一盞去滓食前溫服

玄青丸 治下痢勢惡窘痛膿血頻併或久不愈宜下之

黃連 黃蘗 大黃 甘遂

大戟

芫花

醋沙各五錢

輕粉

二錢

青黛

一兩

牽牛

取頭末二兩

右為細末滴水為丸如豆大初服十九每加十九空心午
前臨卧三服以利為度